

IV-ព្យាបាល និងការការពារ :

ក-ព្យាបាល

ប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដូចខាងក្រោម :

-Triclabendazole (Fasinex) កំរិត ១២ម.ក្រ/គក្រ

ទំងន់សត្វរស់ ដោយបញ្ជាក់តាមមាត់ ។

-Albendazole កំរិត ១៥ម.ក្រ/គ.ក្រ ទំងន់សត្វរស់

ដោយបញ្ជាក់តាមមាត់ ។

-Nilzan កំរិត ១៥ម.ក្រ/គ.ក្រ ទំងន់សត្វរស់ដោយ

បញ្ជាក់តាមមាត់ ។

-Nitroxinile (Dovenix-25%) ចាក់ក្រោមស្បែកកំរិត

១ម.ល/២៥គ.ក្រ ទំងន់សត្វរស់ ។

-Oxyclozanide កំរិត ១៥ម.ក្រ/គ.ក្រ ទំងន់សត្វរស់

ដោយបញ្ជាក់តាមមាត់ ។



ខ-ការការពារ

-ប្រមូលលាមកសត្វ រក្សាក្នុងរណ្តៅរយះពេលយ៉ាងតិច ពីរខែ មុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាដី ។ ធ្វើយ៉ាងនេះអាច

កំចាត់ស៊ីតព្រូនហ្វាស្យូឡាបាន ។

-បញ្ចៀសសត្វទឹក ស៊ីស្មៅ រុក្ខជាតិទឹក គល់ជញ្ជាំងជា ទឹកនៃឆ្នងជំងឺ ។

-ចៀសវាងផ្តល់ចំណី ដូចជាស្មៅរុក្ខជាតិទឹកមានប្រភពពី កន្លែងឆ្នងជំងឺ ។

-បំបាត់ខ្យងលីមណេអា ដែលជាម្ចាស់កណ្តាលព្រូន ហ្វាស្យូឡា ដោយការចិញ្ចឹមទា និងត្រី ។



បញ្ចៀសសត្វទឹក ស៊ីស្មៅ រុក្ខជាតិទឹកជាទឹកនៃឆ្នងជំងឺ



នាយកដ្ឋាន ឆ.ប



ACIAR

ជំងឺបង្កដោយព្រូនហ្វាស្យូឡា (Fasciolosis)



គំរោង ACIAR , ASI/2002/099
 រៀបចំដោយ : នាយកដ្ឋាន ផលិតកម្ម និង បសុព្យាបាល
 នាយកដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
 #៧៤ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
 Tel/Fax : 023 991 839
 E-mail: Sothoendahp@online.com.kh

ជំងឺបង្កដោយព្រូនហ្វាស្យូឡា បណ្តាលមកពីព្រូនសំប៉ែត ត្រេម៉ាតូត (Trematode) ប្រភេទហ្វាស្យូឡាហ្គីហ្គង់ទីកា (Fasciola gigantica) កើតលើសត្វស្រុក និងព្រៃច្រើនប្រភេទ ជាពិសេស គោ ក្របី ច្រៀម និងពពែ ។

ជំងឺនេះបណ្តាលអោយសត្វស្លាប់ចុះទំងន់ មួយចំនួនតូច ងាប់ ផលិតភាពបន្តពូជទាប ឆ្លើមខូច ផលិតផលថយចុះ ហើយ សត្វមិនសូវមានកំលាំងមាំមួន ។ល។


I- ទំរង់និងរូបរាង :

ព្រូនមានរាងសំប៉ែត ពណ៌ប្រផេះ តោត ប្រវែង ៣,៥-៧,៥ ស.ម ខ្លួនមានរាងស្របគ្នាផ្នែកក្បាល (ស្នាមុខ) និងកន្ទុយ ។ ប្រវែង ស្នាមុខ និងកន្ទុយ មានប្រវែង ០,៦៥ -១,២ ស.ម ។

II- វដ្តជីវិត :

ព្រូនហ្វាស្យូឡារស់នៅក្នុងឆ្នើម បញ្ចេញស៊ីតមកក្រៅ តាមរយៈលាមក រយៈពេលពី ១០-១២ ថ្ងៃ ស៊ីតព្យាសបានជា មីរ៉ាស៊ីដ្យូម (Miracidium) ។ មីរ៉ាស៊ីដ្យូមនៅក្នុងទឹកជ្រាត ចូលក្នុងខ្យងលីមណេអា (Lymnaea) ដែលជាម្ចាស់កណ្តាល របស់ព្រូនហ្វាស្យូឡា ។ នៅក្នុងខ្យងលីមណេអា មីរ៉ាស៊ីដ្យូម លូតលាស់ និងក្លាយជា ស្ទ័រ៉ូស៊ីស (Sporocyst) រ៉េដ្យា (Rediae) និងស៊ីការីយ៉ា (Cercariae) ដែលរយៈពេល លូតលាស់ពីមីរ៉ាស៊ីដ្យូមដល់ស៊ីការីយ៉ា មានពី ៤-៧ សប្តាហ៍ ។ ស៊ីការីយ៉ាចេញពីខ្យងលីមណេអា តោងស្មៅ រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក ស្រូវ ។ ល។ ហើយក្លាយជាគីស្តដែលហៅថា មេតាស៊ីការីយ៉ា

(Metacercaria) ។ សត្វត្រូវបានឆ្លងដោយសារ បានលេប ផឹក ស៊ីស្មៅ រុក្ខជាតិទឹក (គល់ជ្រូក ឬ ចំបើង) មានមេតាស៊ី- ការីយ៉ា ។ ករណីខ្លះជំងឺអាចឆ្លងទៅកូនតាមរយៈសុក កូនព្រូន ហ្វាស្យូឡា ត្រូវបាននាំទៅឆ្លើមហើយរស់នៅទីនោះ រហូតដល់ ពេញវ័យ ។



វដ្តជីវិតព្រូនហ្វាស្យូឡា



ខ្យងលីមណេអា



ទឹកន្លែងរស់នៅខ្យងលីមណេអា

III- រោគសញ្ញា :

- សត្វភាគអាចម៍ ពិសេសលាមកជាប់គូថមានពណ៌ក្រមៅ
- រោមស្លួត បាស់ ស្រអាប់
- ស្លុម ចុះទំងន់
- ហើមត្របកភ្នែក ភ្លាសត្របកភ្នែកស្លេក លឿង
- ហើមមុំថ្ពាម និងទ្រូង

